

MACRO



Nutrimentos



CERO
residuo



Linea

bival
Distribución del Levante BIOVAL S.L.

MACRO-GEL

BIOVAL DENSO SLOW N 44

NITRÓGENO CON DCD

UNE LIBÉRATION LENTE

ENGRAIS



TENEUR DÉCLARÉE

Azote (N) Total	44,0% p/v
Azote (N) Ammoniacal	10,56% p/v
Azote (N) Nitrique	10,56% p/v
Azote (N) Amide	22,88% p/v
DCD (Dicyandiamide)	0,30% p/v

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Formulation: GEL

pH (une solution 1%): 6-7

E.C. mS/cm (une solution 1%): 0.8

Couleur: jaune

Densité (gr/cc): 1,32



DES PROPRIÉTÉS

Un engrais d'hauteur contenue dans un azote avec dicyandiamida (DCD) inhibiteur du nitrification pour retarder la transformation de l'azote amoniacal et amidico dans nitrique, le processus qui garantit une fontaine assimilable et constante d'un azote nitrique et la réduction aux minimas de pertes d'azote par lixiviation.

Par sa formulation (amidico+amoniacal+nitrico) BIOVAL DENSO SLOW N 44 (DCD) il se manifeste comme engrais d'ample spectre, d'assimilation rapide et d'usage économique par l'homogénéité, la précision et la basse dose nécessaire dans son utilisation.

Son usage favorise la croissance et le développement végétatif, à une fin vitalizante, stimulant et favorable de l'absorption de macro et des micronutriments et son effet devenu sur le développement de la production.



POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

Folioter : 150-300 cc/hl dans 4-7 applications, selon une culture.

Fertirrigación : 15-20 L/ha et une année (4-7 applications à une raison 100-200 cc/hl) selon une culture.

On recommande de suivre cependant les doses et les applications établies par ses technicien à j'ai piailé du champ qu'ils varieront selon un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais et l'état fenológico de même. Depuis "Distribución del Levante Bioval, S.L." ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.

STOCKAGE :

Un produit stable s'il n'est pas dilué au préalable.
Conserver dans son paquet original.
Procurer un stockage dans un lieu sec, frais et sans une longue exposition au soleil.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux.
N'empiler à plus de 4 hauteurs.
On recommande de donner un usage avant 2 ans de la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans un paquet.

PRÉSENTATION:



UN AVERTISSEMENT: Par pivot, une aspersion et un dégouttement, utiliser des tuyauteries de matériels adéquats et utiliser une seule eau à la fin de l'arrosage pour le lavage des circuits. Éviter des excès de dose puisque puerde retarder la maturation et sensibiliser l'attaque de champignons. Ne pas mêler avec bouillon sulfocálcico, dinocap, de soufre, ni de produits de réaction alcaline. Ne pas user dans une culture d'agrumes.