

BIO**Protection****CERO
residuo**
bival
 Distribución del Levante BIOVAL S.L.
CORRECTORS**BIOVAL Mn-Zn CITRICS**

CORRECTEUR DES MANQUES

MANGANÈSE ET ZINC

FLOW FORMULÉ

SPÉCIAL DES AGRUMESENGRAIS **CE****TENEUR DÉCLARÉE**

Zinc (Zn) Total	13,50% p/v
Manganèse (Mn) Total	13,50% p/v
Azote (N) Total	5,80% p/v

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Densité: 1,65

pH (solución 10%): 5,5-6,5

**DES PROPRIÉTÉS**

Sa formulation spéciale et une haute concentration aide à prévenir et à simultanément corriger des déficiences de le manganèse et de zinc. L'application combinée de Zinc et de Manganèse est plus effective que l'application de chaque élément par séparé.

De bas niveaux de zinc réduisent le nombre de fruits par arbre et, par étendue, la taille de le même. Un symptôme de déficience de zinc dans des agrumes est l'apparition de taches tu folioteras chlorotiques et(ou) des aires blanchâtres avec des veines verdâtres. Quant à lui la déficience de manganèse, il se manifeste fréquemment par moucheté jaunâtre des feuilles.

Grâce à la composition de BIOVAL Mn-Zn CITRICS il est possible d'optimiser l'apport de nutriments (Zn et Mn) de forme plus persistante dans la feuille avec ce que la période d'effectivité de l'application est plus longue.

Avec BIOVAL MnZn CITRICS il réussira à augmenter la taille de la feuille, de bourgeons et de fruits, à améliorer le contenu dans une vitamine C et à obtenir plus de fruits dans l'arbre.

**POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:**

FOLIOTER : 250-450 cc/hl (2-4 applications durant le cycle conformément aux nécessités printemps-été).
Méthode d'Arrosage par le Dégouttement:
 4-10L/hectárea (2-4 applications par cycle selon des nécessités).

On recommande de suivre cependant les doses et les applications établies par ses technicien à j'ai piailé du champ qu'ils varieront selon un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais et l'état fenológico de même. Depuis "Distribución del Levante Bioval, S.L." ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.

STOCKAGE:

Stocker dans le paquet original.
 Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct.
 Agiter avant d'user
 Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
 N'empiler à plus de 4 hauteurs
 Son usage est recommandé avant 2 ans depuis la date de lot.
 Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans un paquet.

PRÉSENTATION:

45