

MACRO-CLASSIC

BIOVAL N UREA LANN
UN ENGRAIS AZOTÉ 28-0-0
AVEC URÉE UN
FORMALDÉHYDE
FORMULÉ UNE SOLUTION UN
"EFFET DÉMARRE"

TENEUR DÉCLARÉE

Azote (N) Total	28,0% p/p
Azote (N) Ureico	11,0% p/p
Azote (N) d'urée-formaldéhyde	17,0% p/p

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Gravité spécifique: 1,25 gr/ml
pH (une solution 1%): 6-7
Couleur: Vert
Odeur: Caractéristique

DES PROPRIÉTÉS

L'engrais azoté qui garantit une haute efficacité et une persistance à travers de sa forme ureica pour garantir les nécessités immédiates de la plante ("un effet démarre") et sa forme originaire d'urée un formaldéhyde pour assurer la disponibilité progressive et graduelle de l'azote d'une manière sûre et respectueuse avec l'environnement.

BIOVAL N UREA LANN peut être mêlée par la majorité de phytosanitaires du marché excepté avec "tebuconazol", dans une culture de céréales d'hiver aux températures supérieures à 25°C. Il se conseille, cependant, faire une preuve préalable significative.

Aux eaux dures prend conseil l'ajout de correcteur de pH pour maintenir un pH proche de la neutralité.

Dans fertirrigación on est un applicable cigare ou dilué dans une eau.



UN AVERTISSEMENT:

Incompatible avec les solutions qui contiennent un nitrate d'ammonium, ou avec quelques produits comme un acide phosphorique, nitrique, sulfurique, des phosphates monoamínico et monopotassique et un sulfate d'ammonium.

On recommande de suivre cependant les doses et les applications établies par ses technicien à j'ai piailé du champ qu'ils varieront selon un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais et l'état fenológico de même. Depuis "Distribución del Levante Bioval, S.L." ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.

STOCKAGE:

Un produit stable s'il n'est pas dilué au préalable.
Conserver dans son paquet original.
Procurer un stockage dans un lieu sec, frais et sans une longue exposition au soleil
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux.
N'empiler à plus de 4 hauteurs.
Utiliser avant 2 ans de la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans un paquet



POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

- 10-15L/hectárea. Un maïs : une post-urgence précoce.
- 10-25 L/hectárea. Un riz, des céréales ..., dans un commencement végétatif, un filleul ou une urgence une feuille de drapeau.
- 5-10 L/hectárea. Des agrumes : une application dans une différenciation florale, après le gâteau de fruits et hachis de viande sucré et depuis une réactivation végétative.
- 5- 10L/hectárea. Des légumes de feuille: à la formation du rejeton et revenir chaque 14 jours, et horticoles, avant la fleuraison.
- 64-120 l/hectárea. Un olivier, depuis une fleuraison et chaque 30 jours, et à la fin d'un hiver depuis une réactivation végétative.
- 48-80 L/hectárea. Une vigne: une post-fleuraison et une fin de l'hiver depuis une réactivation végétative.

PRÉSENTATION:

