biOval
Agricultura BioSostenible
MICRONUTRICIÓN
info@dlbioval.es
+34 961148762

DLB BORO

Fertilizante “boratado” en solución para aplicación foliar. Previene y corrige las fisiopatías de este elemento. Normalmente estas fisiopatías se suelen producir en suelos ligeros y con drenaje o por el contrario en suelos calcáreos, en momentos de sequía o lluvia prolongada.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Boro (B) soluble en agua	11,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Frutales	Para evitar el acorchado (bitter pit), agrietado y el charco papiráceo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Hortícolas	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Vid	Para mejorar la floración y evitar el corrimiento del racimo, evitar frutos pequeños y arrugados durante el ciclo vegetativo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Tropicales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Frutos del bosque, frambuesas...	Antes y después de la floración.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 100-200 cc/hl Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Merma de producción, hoja de color tabaco y aceitunas deformadas (cara de mono), secado de ramas.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Café	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-500 cc/hl
Alfalfa	Después de cada corte o en cortes alternos.	1 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. La dosis general en extensivo será de 2-4 L/ha y en el resto de cultivos de 2-3 L/ha. Respetar las dosis indicadas.

DLB BORMI

Mezcla de boro en forma monoetanolamina con aminoácido que mejora la absorción de este micronutriente por el tejido, influyendo sobre varios de los procesos bioquímicos y fisiológicos de la planta. El nivel de boro óptimo en el tejido vegetal permite mejorar la viabilidad del polen, influyendo directamente sobre la floración. En la fase de crecimiento de frutos, el boro interviene en el mejoramiento de la elasticidad del tejido, evitando la formación de rajaduras y en la maduración del mismo. Favorece la translocación de azúcares de hojas hacia frutos y aumenta el rendimiento de estos.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Aminoácidos libres	3,00%
Nitrógeno (N) Total	2,81%
Nitrógeno (N) Orgánico	2,64%
Boro (B) soluble en agua	7,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Frutales	Para evitar el acorchado (bitter pit), agrietado y el chancro papiráceo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Hortícolas	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Vid	Para mejorar la floración y evitar el corrimiento del racimo, evitar frutos pequeños y arrugados durante el ciclo vegetativo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Tropicales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Frutos del bosque, frambuesas, etc.	Antes y después de la floración.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 100-200 cc/hl Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Merma de producción, hoja de color tabaco y aceitunas deformadas (cara de mono), secado de ramas. En primavera.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl Extra: 500-600 cc/hl
Café	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en preventivo por necesidad del cultivo.	Preventivo: 100-200 cc/hl Curativo: 250-350 cc/hl
Alfalfa	Después de cada corte o en cortes alternos.	1 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. La dosis general en extensivo será de 2-4 L/ha y en el resto de cultivos de 2-3 L/ha. Respetar las dosis indicadas.

DLB CALCIO 10

Corrector de carencias de calcio que contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos favoreciendo su asimilación) para combatir y prevenir carencias nutricionales provocadas por la carencia de calcio. Va a contribuir al perfecto desarrollo de la planta, cubriendo las necesidades en calcio indispensables para conseguir un cultivo de primera calidad. Estabiliza y fortalece las paredes celulares para impedir la degradación de los tejidos cuando se inicia la madurez.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Nitrógeno (N) Total	6,00%
Nitrógeno (N) Nítrico	6,00%
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	10,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En preventivo al inicio del verano para prevenir el “rajado” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutales	En preventivo al inicio del verano para prevenir el bitter pit en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Hortícolas	En preventivo al inicio del verano para prevenir el “rajado” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-40 L/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores para prevenir el “rajado” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha, en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

DLB CALCIO +AA

Corrector de carencias de calcio para combatir y prevenir carencias nutricionales provocadas por la carencia de calcio (Ca). Contiene aminoácidos esenciales que facilitan y mejoran la absorción del calcio. Va a contribuir al perfecto desarrollo de la planta, cubriendo las necesidades en calcio indispensables para conseguir un cultivo de primera calidad.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Nitrógeno (N) Total	7,80%
Nitrógeno (N) Nítrico	6,40%
Nitrógeno (N) Orgánico	1,00%
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	9,50%
Aminoácidos Libres	4,60%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Plátanos	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-36 L/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Frutos del bosque, frambuesas, etc.	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-36 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha, en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

DLB CALIBOR

Corrector de carencias de calcio y boro que contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos favoreciendo su asimilación) para combatir y prevenir carencias nutricionales provocadas por la carencia de Calcio (Ca) / Boro (B). Mejora el cuajado de frutos. El Boro favorece la rápida asimilación del Calcio para trasladar a este a los órganos más jóvenes del cultivo.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	10,00%
Boro (B) soluble en agua	1,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En preventivo al inicio del verano para prevenir el “rajado” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutales	En preventivo al inicio del verano para prevenir el bitter pit en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Hortícolas	En preventivo desde las primeras flores para prevenir el “rajado” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-40 L/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores para prevenir el “rajado” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Viveros Ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha, en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

DLB Fe EDDHA

Fórmula granulada y micronizada WSP totalmente soluble de elevadísima pureza. Está especialmente indicado como corrector de clorosis férrica, deficiencias de hierro, para suelos alcalinos en riego por goteo o cualquier otro sistema. Resulta eficaz en todo tipo de cultivos, como frutales hortícolas, florales, tropicales y ornamentales. El mismo contenido en hierro, pero con diferentes contenidos en orto-orto, depende de la alcalinidad del suelo en que se encuentre nuestro cultivo. A mayor pH del suelo, el contenido en el isómero orto-orto debe ser mayor.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Hierro (Fe) soluble en agua	6,00%
Hierro (Fe) quelado por EDDHA	6,00%
Hierro (Fe) quelado por EDDHA (isómero orto-orto)	4,80%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos y Frutales de hueso y pepita	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 20-60 g por planta
Viveros de leñosos	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 2-5 g/m^2
Plantones y jóvenes leñosos	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Radicular: 3-15 g por planta
Hortícolas	Durante el ciclo vegetativo y en carencia manifiesta.	Radicular: 0,5 - 1,5 g/m^2
Vid	Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia manifiesta.	Radicular: 3-10 g por planta
Plátanos	Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia manifiesta.	Radicular: 3-12 g por planta
Tropicales	Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia manifiesta.	Radicular: 20-60 g por planta
Frutos del bosque, frambuesas...	Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia manifiesta.	Radicular: 0,5 - 2 g/m^2
Viveros Ornamentales	Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia manifiesta.	Radicular: 2- 5 g/m^2
Olivo	Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia manifiesta.	Radicular: 10-40 g por planta
Café	Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia manifiesta.	Radicular: 3-10 g por planta
Fresa	Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia manifiesta.	Radicular: 0,5 - 2 g por planta

Por sus condiciones físico-químicas el producto se puede aplicar en todo tipo de sistemas de riego como en inyección directa. Es recomendable realizar una predilución para que se hidrate el producto perfectamente. Se se realiza este paso se aplicará lo antes posible. En caso de aplicación directa hacer un riego a continuación de la inyección. Para obtener una mayor efectividad del producto en eficacia y durabilidad es muy recomendable aplicarlo junto a DLB HÚMICOS LÍQUIDOS.

DLB Fe-L

Corrector de carencias de hierro (Fe) en forma líquida para aplicación foliar. Contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos favoreciendo su asimilación), lo que permite que el hierro sea asimilado foliarmente por el cultivo y eliminemos la carencia de forma inmediata.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Hierro (Fe) soluble en el agua	7,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos y Frutales de hueso y pepita	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl
Viveros de leñosos	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl
Hortícolas	Durante el ciclo vegetativo en preventivo y en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl
Vid	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl
Plátanos	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl
Tropicales	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl
Frutos del bosque, frambuesas...	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl
Viveros Ornamentales	Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl
Olivo	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl
Café	Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia manifiesta.	Foliar preventivo: 250-350 cc/hl Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

DLB NUTRICE HIERRO

Corrector sólido quelado con EDTA para combatir y prevenir carencias de Hierro (Fe). Se puede aplicar por vía foliar y radicular. El agente quelante EDTA es un quelato estable en un intervalo de estabilidad entre 4-7,5.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Hierro (Fe) soluble en agua	13,00%
Hierro (Fe) quelado EDTA	13,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en floración.	Foliar: 75-100 g/hl Radicular: 4-8 kg/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Plátanos	En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Frutos del bosque, frambuesas...	Durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha
Viveros ornamentales	Durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 g/m^2
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación foliar no tratar, bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a 25 grados centígrados.

DLB MAGNESIO

Formulado para ser aplicado en toda clase de cultivos que tengan o presenten necesidades de magnesio. Por su composición, puede ser aplicado por vía foliar o fertirrigación. Facilita la absorción y transporte de otros elementos, como el fósforo, en momentos determinados e importantes del cultivo. No hay que olvidar que el magnesio es uno de los principales componentes de la clorofila.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	6,00%
Óxido de Magnesio (MgO) complejado	6,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutales	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Hortícolas	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo antes o después de lo floración.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-40 L/ha
Tropicales	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Café	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.

DLB MAGNESIO +AA

Corrector de Magnesio (Mg) especialmente preparado para dar buenos resultados en todo tipo de cultivos. Es una formulación formada por aminoácidos que complejan el magnesio. El proceso de formación de los complejos orgánicos metálicos es análogo a aquellos que se forman en la naturaleza entre los aminoácidos y los iones de magnesio.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Nitrógeno (N) Total	8,85 %
Nitrógeno (N) Nítrico	7,00%
Nitrógeno (N) Orgánico	1,20 %
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	10,00%
Aminoácidos Libres	6,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutales	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Hortícolas	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Vid	En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo antes o después de la floración.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha Radicular: 12-20 L/ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-40 L/ha
Tropicales	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 250-350 cc/hl General: 2-3 L/ha cada aplicación Radicular: 12-36 L/ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-24 L/ha
Café	Puede ser aplicado a primeros de primavera, a finales de verano y durante el ciclo vegetativo.	Foliar: 250-350 cc/hl Radicular: 12-30 L/ha

Este producto permite su mezcla con la mayoría de los productos fitosanitarios. No obstante, se recomienda realizar una comprobación previa.

DLB MANGANESO

Corrector líquido complejado con lignosulfato para combatir y prevenir carencias de Manganeso (Mn).

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Manganeso (Mn) soluble en agua	8,00%
Manganeso (Mn) complejado	8,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/Ha
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/Ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación Radicular: 12-20 L/Ha
Vid	Aplicar antes y después de la floración, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl General: 2-3 L/Ha Radicular: 12-20 L/Ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/Ha
Tropicales	Aplicar antes y después de la floración, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/Ha
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación Radicular: 12-20 L/Ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/Ha
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-20 L/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. En el tanque de abonado se puede mezclar con los NPK compuestos o simples menos con el ácido fosfórico. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla, o hacer una prueba previa. En aplicación radicular, para potenciar aún más el efecto, se puede mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.

DLB NUTRICE MANGANESO

Corrector sólido quelado con EDTA para combatir y prevenir carencias de Manganeso (Mn). Se puede aplicar por vía foliar y radicular. El agente quelante EDTA es un quelato estable en un intervalo de pH entre 4-6,5.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Manganeso (Mn) soluble al agua	13,00%
Manganeso (Mn) EDTA quelado	13,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicular: 4-8 kg/Ha
Vid	En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Plátanos	En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Frutos del bosque, frambuesas...	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 g/m^2
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha

Aunque se puede utilizar en aplicación foliar, este producto está también preparado para su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación foliar no tratar, bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a 25 grados centígrados.

DLB ZINC

Corrector líquido complejado con lignosulfato para combatir y prevenir carencias de Zinc (Zn).

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Zinc (Zn) soluble en agua	8,00%
Zinc (Zn) complejado	8,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-25 L/ha
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-25 L/ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación Radicular: 12-20 L/Ha
Vid	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha Radicular: 12-20 L/Ha
Plátanos	Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-25 L/ha
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-25 L/ha
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación Radicular: 12-20 L/Ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-25 L/ha
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-25 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis máxima. En el tanque de abonado se puede mezclar con los NPK compuestos o simples menos con el ácido fosfórico. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación radicular, para potenciar aún más el efecto, se puede mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.

DLB NUTRICE ZINC

Corrector sólido quelado con EDTA para combatir y prevenir carencias de Zinc (Zn). Se puede aplicar por vía foliar y radicular. El agente quelante EDTA es un quelato estable en un intervalo de pH entre 4-7,5.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Zinc (Zn) soluble en agua	15,00%
Zinc (Zn) EDTA quelado	15,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicular: 4-8 kg/Ha
Vid	En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Plátanos	En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en brotación.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Frutos del bosque, frambuesas...	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 g/m^2
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 6-12 kg/Ha

Aunque se puede utilizar en aplicación foliar, este producto está también preparado para su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación foliar, no tratar bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a 25 grados centígrados.

DLB BOROPLUS MAGNESIO

Mezcla sólida de boro y magnesio totalmente soluble y preparada para ser asimilada por la planta. El boro es un elemento fundamental en el cuaje del fruto y el magnesio es el componente principal de la clorofila. La unión de ambos elementos ayuda a la formación del fruto. Se aplicación será desde arranque vegetativo del cultivo hasta cuajado, poniendo así el cultivo en condiciones para obtener un mayor número de frutos.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Boro (B) soluble en agua	11,00%
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	11,00%
Óxido de Magnesio (MgO) complejado	11,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.	Foliar: 150-250 g/hl
Frutales	En prefloración, con carencia manifiesta, o en preventivo, por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Hortícolas	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Vid	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Tropicales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Frutos del bosque, frambuesas...	Antes y después de la floración.	Foliar: 150-250 g/hl
Viveros ornamentales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 100-200 g/hl
Olivo	En preventivo al inicio de brotación, curativo en cualquier ciclo del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Café	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Alfalfa	Después de cada corte o en cortes alternos.	Foliar: 1 Kg/ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Respetar las dosis indicadas.

DLB BOROPLUS Mg-Zn

Mezcla sólida de boro, magnesio y zinc totalmente soluble y preparada para ser asimilada por la planta. El boro es un elemento fundamental en el cuaje del fruto y el magnesio es el componente principal de la clorofila. La unión de ambos elementos ayuda a la formación del fruto. El zinc es fundamental en el metabolismo y participa en la formación de la clorofila, de las auxinas y de las hormonas de crecimiento. Destacamos la riqueza en azufre para realizar una completa nutrición. Su aplicación será desde arranque vegetativo del cultivo hasta cuajado, poniendo así el cultivo en condiciones para obtener un mayor número de frutos.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Boro (B) soluble en agua	8,00%
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua y complejado	5,00%
Zinc (Zn) soluble en agua y complejado	5,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.	Foliar: 150-250 g/hl
Frutales	En prefloración, con carencia manifiesta, o en preventivo, por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Hortícolas	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Vid	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Plátanos	En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y en fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de llenado de frutos.	Foliar: 250-350 g/hl Dosis general: 2-3 kg/Ha
Tropicales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Frutos del bosque, frambuesas...	Antes y después de la floración.	Foliar: 150-250 g/hl
Viveros ornamentales	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 100-200 g/hl
Olivo	En preventivo al inicio de brotación, curativo en cualquier ciclo del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Café	Se puede aplicar con carencia manifiesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.	Foliar: 150-250 g/hl
Alfalfa	Después de cada corte o en cortes alternos.	Foliar: 1 Kg/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Respetar las dosis indicadas.

DLB NUTRICE N+C+M

Corrector de calcio, magnesio reforzado con nitrógeno orientado a los cultivos con grandes exigencias de estos elementos. El calcio ejerce un papel fundamental en la planta. Forma parte activa de hojas, tallos, raíces y frutos. Es responsable de la rigidez de las paredes celulares. El magnesio juega un papel fundamental en la fotosíntesis, por ser parte constituyente de la clorofila que influye sobre la fructificación o cuaje de frutos. Mejora los brotes, haciendo que el crecimiento sea equilibrado y consistente, preparando al cultivo para un mayor desarrollo.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Nitrógeno (N) Total	10,00%
Nitrógeno (N) Nítrico	10,00%
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	11,00%
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	5,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	En preventivo al inicio del verano para prevenir el rajado en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicular: 12-40 L/Ha
Frutales	En preventivo al inicio del verano para prevenir el “bitter-pit” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicular: 12-40 L/Ha
Hortícolas	En preventivo al inicio del verano para prevenir el rajado en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-4 L/Ha cada aplicación Radicular: 12-40 L/Ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicular: 12-40 L/Ha
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo al inicio del verano para prevenir el rajado en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 350-500 cc/hl General: 3-4 L/Ha cada aplicación Radicular: 12-40 L/Ha
Olivo	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicular: 12-40 L/Ha
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 350-500 cc/hl Radicular: 12-40 L/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 3-4 L/ha en aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis general. No mezclar con sulfatos y fosfatos. Para futuras moléculas de fitosanitarios hacer prueba antes de la mezcla o consultar al departamento técnico.

DLB CORRIGE +3

Producto desarrollado para su aplicación preventiva y curativa mediante pulverizaciones foliares, tanto en cultivos herbáceos o leñosos. Complejo orgánico como corrector triple de zinc, manganeso y magnesio. Aplicado correctamente y en las dosis adecuadas produce un incremento notable en los niveles nutricionales.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Manganeso (Mn) soluble en agua y complejado	2,50%
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua y complejado	2,50%
Zinc (Zn) soluble en agua y complejado	2,50%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Vid	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha
Plátanos	En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en momentos de estrés. En inicio y fase final de engorde. En aplicación radicular en el momento de llenado de frutos.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha Radicular: 5-10 L/Ha
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general 2-3 L/Ha. En aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación.

DLB Zn+Mn MAXI

Corrector concentrado doble de carencias líquido que contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos, favoreciendo su asimilación), de fácil absorción con efecto de bajada y subida por la savia de las plantas. Producto que, por su composición, tiene un efecto directo sobre los brotes jóvenes de las plantas, facilitando la fotosíntesis y el desarrollo foliar. Indicado durante todo el ciclo vegetativo, pero especialmente en inicio de brotación cuando la planta necesita un equilibrio óptimo para una buena floración y posterior cuaje de las flores.

Análisis garantizado **(% m/m)**

Manganeso (Mg) soluble en agua	4,00%
Zinc (Zn) soluble en agua	7,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-24 L/Ha
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-24 L/Ha
Hortícolas	Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación Radicular: 12-20 L/Ha
Vid	Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl General: 2-3 L/Ha Radicular: 12-20 L/Ha
Plátanos	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-24 L/Ha
Tropicales	Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-24 L/Ha
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación Radicular: 12-20 L/Ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-24 L/Ha
Café	Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl Radicular: 12-24 L/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación.

DLB Zn+Mn RADICULAR

Producto desarrollado para su aplicación preventiva y curativa mediante aplicaciones radiculares, tanto en cultivos herbáceos como leñosos. El zinc es un micronutriente esencial para la activación de procesos enzimáticos, formación de almidón, peptidasas y proteínas. También impide la destrucción de auxinas. El manganeso, micronutriente esencial para la formación de clorofila, es catalizador de reacciones de oxidación-reducción en diversos procesos metabólicos. Es un producto altamente específico para la activación de procesos enzimáticos de la planta y para la formación de proteína.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	3,00%
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	5,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano, en caso necesario aplicar también en otoño.	Radicular: 10-20 L/Ha
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Radicular: 10-20 L/Ha
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 12-20 L/Ha
Vid	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 12-20 L/Ha
Plátanos	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo en varios riegos.	Radicular: 10-20 L/Ha
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 10-20 L/Ha
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Radicular: 10-20 L/Ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 10-20 L/Ha
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo.	Radicular: 10-20 L/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general 2-3 L/Ha. En aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación. En aplicación radicular se aconseja mezclar con aminoácidos, materias orgánicos o ácidos húmicos.

DLB MIX Q-7

Mezcla líquida de microelementos que contiene LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos, favoreciendo su asimilación), totalmente solubles para ser utilizados tanto por vía radicular como por vía foliar. Los micronutrientes son fundamentales en la nutrición de las plantas, aunque son necesarios en pequeñas proporciones. Una carencia de cualquiera de ellos se puede manifestar tardíamente y mientras tanto el cultivo no se ha desarrollado con normalidad. Por tanto, es muy necesario realizar tratamientos preventivos y no esperar a que la carencia se manifieste.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Boro (B) soluble en agua	0,30%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,20%
Hierro (Fe) soluble en agua	1,50%
Manganeso (Mn) soluble en agua	1,00%
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,10%
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	6,00%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,30%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a primeros de otoño.	Foliar: 200-250 cc/hl
Frutales	Aplicar en primavera y verano.	Foliar: 200-250 cc/hl
Hortícolas	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Vid	Aplicar antes de la floración tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl General: 2-3 L/Ha
Plátanos	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo en varios riegos.	Foliar: 200-250 cc/hl
Tropicales	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl
Frutos del bosque, frambuesas...	En preventivo desde las primeras flores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias manifiestas.	Foliar: 200-300 cc/hl General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 cc/m^2
Olivo	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl
Café	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.	Foliar: 200-250 cc/hl

Se recomienda utilizar el caldo suficiente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación. En aplicación radicular, se aconseja mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.

DLB MIXLAND

Corrector sólido de carencias múltiples quelado por EDTA y hierro quelado en forma de EDTA y EDDHA para su aplicación por vía foliar y radicular en suelos neutros o con baja alcalinidad. Su forma química permite que el producto sea absorbido rápidamente por las hojas y raíces según tipo de aplicación.

Análisis garantizado	(% m/m)
Boro (B) soluble en agua	0,50%
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA	0,50%
Hierro (Fe) soluble en agua	7,00%
Hierro (Fe) quelado por EDTA	6,50%
Hierro (Fe) quelado por EDDHA	0,50%
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	3,00%
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,20%
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,50%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicular: 4-8 Kg/Ha
Vid	En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Plátanos	En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Frutos del bosque, frambuesas...	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 g/m^2
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha

Aunque se puede aplicar en vía foliar, este producto está preparado para su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicacion foliar no tratar, bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a 25 grados centígrados. Respetar las dosis indicadas.

DLB MIXTRAL

Corrector de carencias múltiples en forma de polvo soluble. El hierro, manganeso, zinc y cobre se encuentran quelados con EDTA lo que garantiza su estabilidad y disponibilidad en un amplio margen de pH. El boro y molibdeno se encuentran en forma mineral totalmente soluble y asimilable por las plantas.

Análisis garantizado	**(% m/m)**
Boro (B) soluble en agua	2,50%
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA	0,50%
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA	7,00%
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	5,00%
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,40%
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	3,00%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicular: 4-8 Kg/Ha
Vid	Se puede aplicar en estado preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Plátanos	Se puede aplicar en estado preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Frutos del bosque, frambuesas...	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en floración.	Radicular: 2-3 g/m^2
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha

Aunque se puede aplicar por vía foliar, se aconseja su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado a tratamientos fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o haciendo una prueba previa.

DLB MIX Q-6

Corrector de carencias múltiples quelados en forma WSP para su aplicación por vía foliar y radicular. Al presentarse en forma totalmente quelatada, el cultivo lo aprovecha al máximo porque el agente quelatante protege al ion metálico de posibles bloqueos que pudieran producirse.

Análisis garantizado	(% m/m)
Boro (B) soluble en agua	0,50%
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA	0,50%
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA	8,00%
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	3,30%
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,20%
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,75%

CULTIVOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Frutales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Hortícolas	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en brotación.	Foliar: 75-100 g/hl Radicular: 4-8 Kg/Ha
Vid	En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Plátanos	En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en curativo cuando aparezca la carencia.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Tropicales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Frutos del bosque, frambuesas...	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha
Viveros ornamentales	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en floración.	Radicular: 2-3 g/m^2
Café	Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio de primavera y verano.	Foliar: 100-150 g/hl Radicular: 5-10 Kg/Ha

Aunque se puede aplicar en vía foliar, este producto está preparado para su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo suficiente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado con fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicacion foliar no tratar, bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a 25 grados centígrados. Respetar las dosis indicadas.

info@dlbioval.es

+34 961148762